

DOXIVET INYECTABLE®



Antibiótico de amplio espectro
Solución inyectable



COMPOSICIÓN:

Doxiciclina (hiclato).....100 mg
Excipiente c.s.p.....1 ml

PROPIEDADES: Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que impiden la síntesis de las proteínas bacterianas. Esta acción antibacteriana es el resultado de la fijación a la subunidad ribosómica 30S de los ribosomas por uniones quelantes con los grupos fosfato en el RNA mensajero. Impiden pues la fijación del RNA de transferencia sobre el RNA mensajero.

Su espectro de acción comprende:

Bacterias Gram(-): *Pasteurella* spp., *Escherichia coli* y *Salmonella* spp.

Bacterias Gram(+): *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp.

Algunos anaerobios como *Clostridium* spp.

Mycoplasmas spp.

Rickettsias (anaplasma), Clamidas y algunos protozoos.

INDICACIONES:

Bovino: Neumonías, bronconeumonías o pasteurelosis causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la Doxiciclina.

Ovino y caprino: Neumonías causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la Doxiciclina.

Porcino: Neumonías, bronconeumonías causadas o complicadas por microorganismos sensibles a la Doxiciclina.

ESPECIES DE DESTINO: Bovino, porcino, ovino y caprino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Vía intramuscular.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Bovino: 1 ml/10 kg p.v. al día, durante 4 - 5 días.

Porcino, ovino y caprino: 0,4 - 0,6 ml/10 kg p.v. al día, durante 4 - 5 días. No administrar más de 10 ml en el mismo punto de inoculación.

CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en animales con antecedentes de sensibilidad a las tetraciclinas.

No administrar a animales con alteraciones hepáticas graves.

No administrar a hembras gestantes o hembras en lactación cuya leche se destine al consumo humano.

INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES: No administrar de forma conjunta con antibióticos bactericidas.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Fotosensibilización.

En tratamientos prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

La inyección intramuscular puede ser dolorosa, pudiéndose producir en algún caso inflamación y necrosis en el punto de inoculación.

SOBREDOSIFICACIÓN: Las tetraciclinas presentan una toxicidad relativamente baja, pudiendo aparecer trastornos gastrointestinales.

PERIODO DE SUPRESIÓN:

Carne: 28 días.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco (temperatura inferior a 25° C) y protegido de la luz.

PRESENTACIONES:

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

REGISTRO SANITARIO: 2C1-3930-AGROCALIDAD.

FABRICADO POR: DIVASA FARMAVIC S.A.-ESPAÑA.

IMPORTADO POR: DIVASA FARMAVIC DEL ECUADOR S.A.